

BES

El Boletín Epidemiológico Semanal BES

es una publicación de tipo informativo que presenta el comportamiento de los principales eventos de interés en salud pública, que son vigilados por la secretaria de salud departamental de La Guajira, mostrando los casos que son notificados por las instituciones de salud y entidades territoriales. Tiene en cuenta los acumulados semanales y los promedios históricos.

Las cifras que publica el BES de casos y de muertes están siempre sujetos a verificación o estudio.

El BES es un insumo útil para la comprensión de los eventos en salud pública, pero debe complementarse con otras fuentes. La consulta de este documento es pública.

Los datos de Sivigila tienen procesos de ajuste por rezagos en la notificación.


COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN

El reporte de Unidad Notificadora Departamental UND en la oportunidad en la notificación hasta la semana No 42 se obtiene un 100% (42/42) y en el cumplimiento de la misma en un 100% (42/42).

Las unidades notificadoras municipales (UNM) a nivel departamental fue del 100 % (42/42 UNM), se observa el mismo cumplimiento (100%) respecto a la semana No 42 de 2023.

El cumplimiento de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) esta semana fue de 99,4%.

Mapa de comportamiento en la notificación al SIVIGILA por UNM- S.E. No 42 año 2024



FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

SITUACIÓN DEPARTAMENTAL


Para el análisis de los eventos en el departamento se comparó el valor observado en la semana epidemiológica correspondiente, con una línea de base de referencia, que está conformada de la información de esos eventos reportados en el intervalo de tiempo de al menos cinco años anteriores. Para el análisis se excluyó el 2020 como año atípico en el comportamiento de la gran mayoría de eventos.

Los datos son ajustados semanalmente por rezago en la notificación de los eventos de interés en salud pública.

Se identifica que en la semana epidemiológica No 42 del 2024, de la desnutrición aguda moderada y severa en niños menores de 5 años, mortalidad materna, morbilidad materna extrema, mortalidad perinatal y neonatal tardía, violencia de género, intento de suicidio, intoxicaciones por sustancia químicas, se encuentran por encima de lo esperado, comparado con promedio de los últimos 5 años; para la semana analizada.

En disminución se encuentra, la mortalidad integrada en menores de 5 años, el resto de los eventos notificados se mantienen dentro de lo esperado para esta semana epidemiológica analizada y el dengue se encuentra estable.

Comparación de la notificación de casos de eventos priorizados, según su comportamiento histórico. La Guajira, S.E. 42 - año 2024



FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

EVENTOS TRAZADORES- LA GUAJIRA

DENGUE Y DENGUE GRAVE

Hasta la semana epidemiológica 42 de 2024 se notificaron **1217** casos de dengue. Según su clasificación, en el sistema hay 1204 casos de Dengue y clasificados así: **510** (42%) sin signos de alarma; **694** (57%) con signos de alarma, y **13** casos (1%) de dengue grave.

En La Guajira, el distrito de Riohacha con (597 casos) aporta el 49% de los casos en el departamento.

El departamento presenta un **49% de casos dengue con signos de alarma y dengue grave**, asimismo, siete (7) de los municipios presentan un porcentaje superior o igual al 58,1, % de dengue con signos de alarma y dengue grave durante el periodo analizado. Los municipios con mayor porcentaje de DCSA + DG son: Barrancas, Uribí, Albania, Hatonuevo, Manaure, San Juan del Cesar y Maicao.

Clasificación de casos de dengue por municipio de procedencia, La Guajira, S.E 42 de 2024

Municipios	Dengue sin signos de alarma (DSA)		Dengue con signos de alarma (DCSA)		Dengue grave (DG)		Total		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Albania	6	1,2	11	1,6	0	0,0	17	1,4	64,7
Barrancas	17	3,3	31	4,5	0	0,0	48	4,0	64,6
Dibulla	27	5,3	34	4,9	1	7,7	62	5,2	56,5
Distracción	9	1,8	6	0,9	0	0,0	15	1,2	40,0
El Molino	4	0,8	2	0,3	0	0,0	6	0,5	33,3
Fonseca	12	2,4	14	2,0	0	0,0	26	2,2	53,8
Hatonuevo	29	5,7	58	8,4	0	0,0	87	7,2	66,7
La Jagua Del Pilar	3	0,6	0	0,0	0	0,0	3	0,2	0,0
Maicao	21	4,1	63	9,1	1	7,7	85	7,1	75,3
Manaure	8	1,6	26	3,7	1	7,7	35	2,9	77,1
Riohacha	270	52,9	318	45,8	9	69,2	597	49,6	54,8
San Juan Del Cesar	13	2,5	20	2,9	0	0,0	33	2,7	60,6
Uribí	13	2,5	37	5,3	0	0,0	50	4,2	74,0
Urumita	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
Villanueva	78	15,3	74	10,7	1	7,7	153	12,03	49,0
La Guajira	510	100,0	694	100,0	13	100,0	1217	100,0	58,1

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

La incidencia a semana epidemiológica 42 el departamento de La Guajira, presenta una incidencia de 175 casos de dengue por cada 100.000 habitantes en riesgo.

En los municipios: Hatonuevo (583); Villanueva (520), Uribí (378); Riohacha (276), Distracción (201), Manaure (250), Barrancas (236), se estiman tasas de incidencia superiores a 175 casos por 100 000 habitantes.

La incidencia de dengue grave en el departamento es de 2 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo. El

municipio con mayor incidencia de dengue grave es Manaure con (7,4); seguido de Riohacha (4,2) y Dibulla (2,3) y Villanueva de (3,4) casos por cada 100.000 habitantes en riesgo.


Tasa de Incidencia de casos de Dengue y Dengue Grave por municipio de procedencia, La Guajira, S.E 42 de 2024.

Municipios	Número de casos Dengue	Tasa de Incidencia de Dengue (*100.000 hab)	Número de casos Dengue grave	Tasa de Incidencia de Dengue Grave (*100.000 hab)
Albania	17	84,6	0	0,0
Barrancas	48	242,0	0	0,0
Dibulla	61	137,8	1	2,3
Distracción	15	201,1	0	0,0
El Molino	6	76,4	0	0,0
Fonseca	26	62,2	0	0,0
Hatonuevo	87	583,4	0	0,0
La Jagua Del Pilar	3	111,9	0	0,0
Maicao	84	43,1	1	0,5
Manaure	34	250,6	1	7,4
Riohacha	588	276,9	9	4,2
San Juan Del Cesar	33	88,7	0	0,0
Uribí	50	378,8	0	0,0
Urumita	0	0,0	0	0,0
Villanueva	152	520,1	1	3,4
La Guajira	1204	175,8	13	1,9

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Municipio de procedencia	Incidencia acumulada x 100.000 habitantes
Hatonuevo	583,0
Villanueva	520,0
Uribí	378,0
Riohacha	276,0
Manaure	250,0
Barrancas	245,0
Distracción	201,0
Dibulla	137,0
La Jagua del Pilar	111,0
San Juan del Cesar	88,0
Albania	84,0
El Molino	76,0
Fonseca	64,0
Maicao	43,0
Urumita	0,0

Incidencia acumulada x 100.000 habitantes	
Percentil 75	263,0 MUY ALTA INCIDENCIA
percentil 50	124,0 ALTA INCIDENCIA
percentil 25	76,0 MEDIANA INCIDENCIA
Menor de Percentil 25	63 BAJA INCIDENCIA




FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Los Municipios que presentan muy alta incidencia con incidencia igual o superiores a 263 casos por cada 100000 habitantes se sitúan: Hatonuevo, Uribía, Villanueva y Riohacha, seguidamente en alta incidencia es decir mayor o igual a 124 casos por cada 100000 habitantes y por debajo de 263 casos por cada 100000 habitantes encontramos a los municipios de:

Distracción, Dibulla, Manaure y Barrancas; en media incidencia se ubican los territorios de: Albania, San Juan del Cesar, La Jagua del Pilar y El Molino con incidencia igual o superiores a 63 y por debajo de 124 casos por cada 100.000 habitantes y baja incidencia por debajo de 63 casos el resto de los municipios.

Canal endémico de dengue, La Guajira, semana epidemiológica 42 año 2024



FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

A semana epidemiológica 42 del presente año, el evento a nivel departamental según el canal endémico se ubica en zona de alerta con tendencia al incremento con respecto a dos semanas anteriores, comparado con su comportamiento histórico, evidenciándose un decremento importante desde la semana epidemiológica No 21 pero se observó un aumento significativo durante de la semana No 27, 29 y posteriormente desde la semana epidemiológica No 36 para semana el Departamento registra situación de alerta.

Cabe resaltar que el año 2022 y el 2023 estuvimos en situación de brote en todas las semanas epidemiológicas, observando el mismo comportamiento en el presente año con el pico más elevado en la semana No 1.

Comportamiento inusual en la notificación del dengue, La Guajira 2024, corte S.E 42

Municipio	Acumulado	Observado	Esperado	Comportamiento
Riohacha	597	14	5	Incremento
Albania	17	2	0	Estable
Barrancas	48	1	2	Estable
Dibulla	62	5	4	Estable
Distracción	15	0	1	Estable
El Molino	6	0	3	Decremento
Fonseca	26	2	6	Decremento
Hatonuevo	87	0	2	Estable
La Jagua del Pilar	3	1	0	Incremento
Maicao	85	2	1	Estable
Manaure	35	1	1	Estable
San Juan del Cesar	33	1	5	Decremento
Uribia	50	3	1	Estable
Urumita	0	0	3	Estable
Villanueva	153	20	8	Incremento
	1217	52	42	Estable

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Seis (6) municipios se encuentran en un comportamiento inusual de estos tres (3) municipios continúan un comportamiento al incremento, es decir: La Jagua del Pilar, Riohacha, Villanueva para esta semana con respecto al periodo epidemiológico analizado y tres (3) al decremento: Fonseca, El Molino y San Juan del Cesar al decremento el resto de los municipios es decir nueve (9) de quince muestran un comportamiento estable.

Nivel de Brote:

Para definir el nivel de brote se tiene en cuenta las definiciones establecidas en la circular N°013 de 2023 "Instrucciones para la organización y respuesta para el control del dengue en Colombia"

Nivel de brote tipo I, entidades territoriales que presentan un comportamiento por encima del límite superior del canal endémico durante al menos tres de las últimas cinco semanas epidemiológicas.

Nivel de brote tipo II, entidades territoriales que presentan un comportamiento por encima del límite superior del canal endémico por al menos seis semanas epidemiológicas, con una tendencia creciente.

Alerta, cuando de acuerdo con el canal endémico se encuentren al menos las últimas dos semanas epidemiológicas por encima de la media (zona de seguridad) y por debajo del límite superior (zona de brote).

Situación epidemiológica del dengue en los Municipios según nivel de brote, La Guajira, S.E 42 de 2024

Municipios	Nivel de brote	Clasificación de los municipios
Villanueva	Brote tipo I	Mediana transmisión
Hatonuevo	Alerta	Mediana transmisión
Dibulla	Alerta	Mediana transmisión
Manaure	Alerta	Alta transmisión
Maicao	Alerta	Mediana transmisión
Riohacha	Alerta	Alta transmisión
Fonseca	Alerta	Baja transmisión
La Jagua del Pilar	Alerta	Mediana transmisión
San Juan del Cesar	Alerta	Baja transmisión
Uribia	Alerta	Mediana transmisión
Barrancas	Control	Mediana transmisión
Albania	Control	Mediana transmisión
El Molino	Control	Baja transmisión
Distracción	Control	Baja transmisión
Urumita	Control	Baja transmisión

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira


Al comparar el PE actual (semanas epidemiológicas (38-41) con el PE anterior (semanas epidemiológicas (36-39) se evidencia que el municipio de Villanueva se sitúa en brote tipo I, continúan en alerta 5 Municipios en los que se encuentran los Municipios de: Riohacha, Hatonuevo, Maicao, Dibulla, Manaure y para esta semana se observan que los municipios de Fonseca, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar y Uribía entra en situación de también de alerta el resto de municipio se encuentran en control para un total de cinco como se observa en el cuadro, **siempre y cuando se esté garantizando la operación del sistema de vigilancia en salud pública.**

DESNUTRICION AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE 5 AÑOS

En cuanto a la notificación de la desnutrición aguda moderada y severa en los niños y niñas menores de 5 años en La Guajira, se puede evidenciar para la semana 42, del año 2024, un total de 2394 casos, mostrando así un aumento en la notificación en comparación al año anterior (2023) al mismo corte, quien registro 2363 eventos de desnutrición aguda. Para las últimas semanas del periodo 6 se muestra una disminución de los casos notificados frente al periodo 6 del 2023.

La Guajira se muestra con un promedio en el año actual de 56 casos por semana epidemiológica, la semana 29 es la que reporto la mayor cifra con 87 niños desnutridos agudos. Ver gráfico siguiente.

Comportamiento de la notificación semanal de la desnutrición aguda moderada y severa en La Guajira corte s. E 42 2023- 2024



FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Para el Departamento de La Guajira en el año 2024 se reporta a la semana epidemiológica 42, 2394 casos de desnutrición aguda moderada y severa en la población menor de 5 años, el municipio con mayor aporte de este evento es URIBIA con 754 casos el 31,5%, seguido de RIOHACHA con 697, el 29% en tercer lugar se ubica a Maicao con 3758 casos, Manaure aporte 363 con el menor porcentaje de los municipios accionados con el 14.9% de los casos, siendo estos cuatro municipios los que reportan el 91% de la notificación, el 9% se encuentra en los municipios de sur del Departamento. la población con nacionalidad venezolana represento el 3,0% de la notificación de la desnutrición aguda moderada y severa en el territorio. Ver tablas siguientes

Distribución de casos de desnutrición aguda moderada y severa por municipio de residencia


MUNICIPIO	CASOS	%
URIBIA	754	31.5
RIOHACHA	697	29.1
MAICAO	372	15.5
MANAURE	363	15.2
DIBULLA	56	2.3
SAN JUAN DEL CESAR	46	1.9
ALBANIA	35	1.5
BARRANCAS	27	1.1
FONSECA	15	0.6
VILLANUEVA	10	0.4
EL MOLINO	6	0.3
HATONUEVO	6	0.3
DISTRACCION	4	0.2
URUMITA	2	0.1
LA JAGUA DEL PILAR	1	0.0
TOTAL	2394	102.1

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira


La desnutrición en el Departamento de la Guajira se encuentra en 14 de los 15 municipios, y de los casos registrados con afiliación el 94% de los niños y niñas reportados, la EPS Anaswayuu es la que mayores casos apor to al corte analizados con 668 casos, Dusakawi en segundo lugar con 468 que la EPS CajaCopi se ubican en tercer lugar con 303, familiar de Colombia con menor número en el cuarto lugar con 245 casos, AIC, NEPS, Y Salud Total muestran un número importante de casos en sus afiliados los niños y niñas no asegurados representaron 84 (5,7%). Ver gráfico siguiente

Distribución de casos de desnutrición aguda moderada y severa en menor de 5 años por EAPB, La Guajira 2024 corte semana 42

Número de casos según EAPB de afiliación. Subsidiado, 2024



Número de casos según EAPB de afiliación. Contributivo, 2024



FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

En cuanto al comportamiento identificado en el corte a semana 42 se evidencia que según el número esperado el Departamento se encuentra superando la cifra esperada según promedio histórico de casos lo cual lo ubica en importancia estadística con un comportamiento inusual al incremento, de igual manera 14 de los municipios de La Guajira Ver gráfico siguiente

Comportamiento inusual de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menor de 5 años en la Guajira año 2024 S. E 42

Municipios	Casos 2024 S. E 42	Valor esperado	poisson	ANALISIS
ALBANIA	35	27	0.023	INCREMENTO
BARRANCAS	27	20	0.025	INCREMENTO
DIBULLA	56	43	0.009	INCREMENTO
DISTRACCION	4	0	0.000	INCREMENTO
EL MOLINO	6	0	0.000	INCREMENTO
FONSECA	15	0	0.000	INCREMENTO
HATONUEVO	6	0	0.000	INCREMENTO
LA JAGUA DEL PILAR	1	0	0.000	INCREMENTO
MAICAO	372	325	0.001	INCREMENTO
MANAURE	363	251	0.000	INCREMENTO
RIOHACHA	697	445	0.000	INCREMENTO
SAN JUAN DEL CESAR	46	23	0.000	INCREMENTO
URIBIA	754	492	0.000	INCREMENTO
URUMITA	2	1	0.217	ESTABLE
VILLANUEVA	10	5	0.015	INCREMENTO
GUAJIRA	2394	1,658	0.000	INCREMENTO

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Al analizar las características sociodemográficas de los niños y niñas notificadas por desnutrición aguda se pudo analizar que los de las edades de 1 a 4 años aportaron el mayor porcentaje con el 74%, los niños con 58%, y la zona rural dispersa con el 64%. En cuanto al régimen de afiliación y la pertenecía étnica los del régimen subsidiado y los indígenas reportan el mayor porcentaje. El 99% de los casos pertenecen al estrato socioeconómico bajo.

Características sociodemográficas de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años La Guajira año 2024 S.E. 1 a 42


CARACTERISTICAS	CASOS	%
EDAD	Menor de 1 año	26
	De 1-4 años	74
SEXO	Femenina	42
	Masculino	58
AREA DE RESIDENCIA	Cabecera municipal	32
	Centro poblado	5
	Rural dispersa	64
TIPO DE REGIMEN EN SALUD	Subsidiado	89
	Contributivo	3
	No asegurado	6
	Indeterminado	1
PERTENENCIA ETNICA	Especial	0
	Excepcion	0
	Indigena	78
	Otros	22
IA ETNICA	Afrocolombiano	0
	Palenquero	0
	Rom gitana	0
	Raizal	0
ESTRATO	1	96
	2	3
	3	1
	4	0

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

MORTALIDAD INTEGRADA EN MENORES DE 5 AÑOS, EDA, IRA Y DNT.


En el Departamento de La Guajira bajo la vigilancia de la mortalidad integrada en menores de 5 años por IRA, EDA y DNT se han registrado **86** muertes para el año en curso 2024 que comparado a semana 3 del año 2023 muestra un decremento en la cifra (112) mostrando un promedio de muertes para el corte analizado (S.E 42) de 83 muertes por año, se evidencia una tendencia a la disminución en el año actual del 24% frente al año anterior. Ver gráfico siguiente.

Número de casos de mortalidad integrada en menores de 5 años por IRA EDA DNT con corte a semana 40 en los años 2019-2024



FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Comportamiento semanal de la mortalidad integrada por clasificación año 2024 SE 1 a 42



FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Al analizar la clasificación de los eventos de la vigilancia integrada de mortalidad casos probables y confirmados en población menor de 5 años, se logra identificar que la desnutrición aguda reporta un número de 32 muertes probables y confirmadas, la mortalidad probable y confirmada por IRA, 29 muertes, la mortalidad por EDA con 25 casos, el municipio de residencia con mayor número de muertes fue Uribia con 31 mortalidades, Maicao con 11, Riohacha 17 casos, Y Manaure con 13 casos. Para el corte analizado el municipio de Albania aportó 4, Dibulla 7 y Fonseca 1 Ver cuadro siguiente

Número de casos Notificados de mortalidad en niños y niñas menor de 5 años en la Guajira por DNT IRA EDA año 2024 S.E 1-a 42

MUNICIPIO	DNT	IRA	EDA	Total general
URIBIA	5	14	12	31
RIOHACHA	11	5	1	17
MANAURE	5	2	6	13
MAICAO	4	5	2	11
DIBULLA	4	2	1	7
ALBANIA	1	1	2	4
FONSECA	1	0	0	1
SAN JUAN DEL CE	1	0	0	1
VILLANUEVA	0	0	1	1
TOTAL	32	29	25	86

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

En el Departamento de la Guajira para el 2024 la notificación de la vigilancia integrada en menor de 5 años por IRA EDA DNT mostro que el mayor número de muertes está en la aseguradora Anaswuayuu con 24 mortalidades en segundo lugar Dusakawi con 18, en tercer lugar, CajaCopi 11 y NEPS con 11 casos, los no asegurados aportaron un número importante de casos con 8 mortalidades, familiar de Colombia y AIC también reportaron mortalidad para este corte. Ver tabla siguiente

Distribución de casos Notificados de mortalidad en niños y niñas menor de 5 años por DNT, IRA EDA, por EAPB en la Guajira año 2024 S.E 1 a 42

EAPB	DNT	IRA	EDA	Total genera
ANASWAYU	8	12	4	24
DUSAKAWI	8	1	9	18
CAJACOPI	5	4	2	11
NEPS	4	4	3	11
NO ASEGURADO	2	2	4	8
FAMILIAR DE COLO	2	3	2	7
AIC	3	2	1	6
SANITAS	0	1	0	1
TOTAL	32	29	25	86

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

En cuanto a la comparación de los casos de mortalidad en la población menor de 5 años por IRA, EDA, DNT se puede evidenciar que la mortalidad por DNTA presenta un decremento para el 2024 frente al 2023 con una diferencia de 22 muertes, de igual manera la mortalidad por IRA con una diferencia de 9 muertes, la mortalidad por EDA muestra el mismo comportamiento frente al 2023 con una diferencia de 2 casos más para 2024 al mismo corte epidemiológico, para la semana 42 se registraron 0 mortalidades

Comparación de casos de mortalidad según la clasificación años 2023 – 2024 S.E 1 a 42

Evento	2023	2024	Diferencia
DNT	53	32	21
IRA	36	29	7
EDA	23	25	-2
total	112	86	26

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

MORTALIDAD MATERNA

Hasta la semana epidemiológica No 42 del año 2024, se han notificado 17 casos de mortalidad materna temprana el departamento de La Guajira, residentes en

los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia, Manaure y Fonseca.

Mortalidad materna según municipio de residencia. La Guajira, S.E. 1 – 42 de 2.024

Municipio de residencia	No de casos	%
Maicao	6	35,3
Riohacha	4	23,5
Uribia	4	23,5
Manaure	2	11,8
Fonseca	1	5,9
La Guajira	17	100,0

Fuente: Oficina de Vigilancia en Salud pública - SIVIGILA.

A la semana epidemiológica No 42 el departamento de La Guajira presenta un incremento de casos de la mortalidad materna en los municipios de Maicao, Manaure y Riohacha; sin embargo, a la fecha no presentan un comportamiento inusual. Ver tabla siguiente:

Comportamiento inusual de la mortalidad materna según municipio de residencia. La Guajira. S. E. 1 – 42 de 2.024

Municipio	Esperado	Observado	Poisson
ALBANIA	1	0	0,607
BARRANCAS	1	0	0,368
DIBULLA	0	0	0,779
DISTRACCION	0	0	1,000
EL MOLINO	0	0	1,000
FONSECA	1	1	0,303
HATONUEVO	1	0	0,607
LA JAGUA DEL PILAR	0	0	1,000
MAICAO	3	6	0,050
MANAURE	1	2	0,184
RIOHACHA	4	4	0,195
SAN JUAN DEL CESAR	0	0	0,779
URIBIA	2	4	0,090
URUMITA	0	0	1,000
VILLANUEVA	0	0	0,779
LA GUAJIRA	13	17	0,051

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

Hasta la semana epidemiológica No 42 del año 2.024, se han notificado 235 casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía de madres residentes en el departamento de La Guajira; presentándose la mayor proporción en los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure. Ver Tabla siguiente:

Mortalidad perinatal y neonatal tardía según municipio de residencia. La Guajira, Semana Epidemiológica 1 – 42 de 2.024

Municipio	Casos	Porcentaje
Maicao	66	28,1
Riohacha	63	26,8
Uribia	49	20,9
Manaure	24	10,2
San Juan del Cesar	6	2,6
Hatonuevo	6	2,6
Villanueva	4	1,7
Barrancas	3	1,3
Dibulla	3	1,3
El Molino	3	1,3
Urumita	2	0,9
Fonseca	2	0,9
Albania	2	0,9
Distraccion	1	0,4
La Jagua del Pilar	1	0,4
Total	235	100,0

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

A la semana epidemiológica No 42 se encuentran en importancia estadística al decremento los municipios de Albania, Barrancas, Fonseca, Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y el departamento de La Guajira. Ver tabla siguiente:

Comportamiento inusual de la mortalidad perinatal y neonatal tardía según municipio de residencia. La Guajira, S.E. 1 – 42 de 2.024

Municipio	Esperado	Observado	Poisson
ALBANIA	8	2	0,016
BARRANCAS	13	3	0,001
DIBULLA	6	3	0,089
DISTRACCION	3	1	0,176
EL MOLINO	1	3	0,061
FONSECA	10	2	0,002
HATONUEVO	6	6	0,161
LA JAGUA DEL PILAR	1	1	0,303
MAICAO	94	66	0,000
MANAURE	21	24	0,066
RIOHACHA	69	63	0,038
SAN JUAN DEL CESAR	14	6	0,012
URIBIA	72	49	0,001
URUMITA	2	2	0,251
VILLANUEVA	3	4	0,180
LA GUAJIRA	320	235	0,000

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Hasta la semana epidemiológica No 42 del año 2.024, se notificaron 1.188 casos de morbilidad materna externa en mujeres residentes en el departamento de La Guajira; presentándose la mayor proporción en los

municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure. Ver Tabla siguiente:

Morbilidad materna extrema según municipio de residencia. La Guajira, S.E. 1 – 42 de 2.024

Municipio de residencia	No de casos	Porcentaje
Maicao	444	37,4
Riohacha	296	24,9
Uribia	160	13,5
Manaure	84	7,1
San Juan del Cesar	40	3,4
Fonseca	35	2,9
Dibulla	29	2,4
Barrancas	26	2,2
Villanueva	20	1,7
Albania	19	1,6
Hatonuevo	13	1,1
Distraccion	9	0,8
Urumita	8	0,7
El Molino	4	0,3
La Jagua del Pilar	1	0,1
Total	1188	100,0

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

La morbilidad materna extrema en el departamento de La Guajira ha presentado un comportamiento inusual al incremento durante la vigencia del año 2.024. A la fecha, se encuentran en importancia estadística los municipios de Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y Urumita. Además, se encuentran en incremento todos los municipios del departamento de La Guajira, a excepción de Hatonuevo, Villanueva y Uribia (este último municipio presenta un comportamiento al decremento con importancia estadística). Ver tabla siguiente:

Comportamiento inusual de la morbilidad materna extrema según municipio de residencia. La Guajira, Semana Epidemiológica 1 – 42 de 2.024

Municipio	Esperado	Observado	Poisson
ALBANIA	21	19	0,083
BARRANCAS	15	26	0,002
DIBULLA	11	29	0,000
DISTRACCION	7	9	0,108
EL MOLINO	2	4	0,090
FONSECA	28	35	0,026
HATONUEVO	13	13	0,110
LA JAGUA DEL PILAR	1	1	0,368
MAICAO	293	444	0,000
MANAURE	64	84	0,003
RIOHACHA	330	296	0,004
SAN JUAN DEL CESAR	29	40	0,010
URIBIA	197	160	0,001
URUMITA	3	8	0,003
VILLANUEVA	21	20	0,087
LA GUAJIRA	1033	1188	0,000

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

La incidencia en La Guajira de violencia de género e intrafamiliar hasta la semana 42 del año 2024, es de 139,7 casos por cada 100.000 habitantes; sin embargo, se observa que algunos municipios superan la cifra del Departamento, citamos entre ellos a Barrancas, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua, Maicao, Riohacha y Villanueva. Ver tabla siguiente.

Tasa de incidencia de violencia de género e intrafamiliar, Entidad territorial de ocurrencia, La Guajira Año 2024, Corte S.E 1-42.

Municipio	No de Casos	%	Tasa de Incidencia
ALBANIA	23	1,6	67,8
BARRANCAS	56	3,9	138,8
DIBULLA	55	3,9	124,3
DISTRACCION	45	3,2	300,3
EL MOLINO	12	0,8	144,8
FONSECA	63	4,4	134,5
HATONUEVO	32	2,3	138,0
LA JAGUA DEL PILAR	9	0,6	223,2
MAICAO	381	26,8	195,7
MANAURE	36	2,5	36,6
RIOHACHA	466	32,8	219,5
SAN JUAN DEL CESAR	54	3,8	103,5
URIBIA	116	8,2	58,0
URUMITA	17	1,2	143,5
VILLANUEVA	54	3,8	175,6
Total general	1419	100,0	139,7

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Hasta la semana 42 del año 2024 se observa que los municipios de: Riohacha, Barrancas, Dibulla, Distracción, La Jagua, Maicao, Manaure, Urumita y Uribia se encuentran en importancia estadística, con tendencia al incremento de casos y los municipios de San Juan, Albania y Villanueva se encuentran hacia el decremento. Ver tabla siguiente.

Comportamiento Inusual de la Violencia de Género e intrafamiliar por municipio, La Guajira año 2024, Corte S.E 1-42

Municipio	Acumulado	Observado	Esperado	Comportamiento
Guajira. Municipio desconocido	0	0	0	Estable
Riohacha	466	466	404	Incremento
Albania	23	23	31	Decremento
Barrancas	56	56	34	Incremento
Dibulla	55	55	50	Incremento
Distracción	45	45	16	Incremento
El Molino	12	12	14	Estable
Fonseca	63	63	62	Estable
Hatonuevo	32	32	20	Estable
La Jagua del Pilar	9	9	2	Incremento
Maicao	381	381	189	Incremento
Manaure	36	36	14	Incremento
San Juan del Cesar	54	54	67	Decremento
Uribia	116	116	56	Incremento
Urumita	17	17	12	Incremento
Villanueva	54	54	89	Decremento

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Tipo de violencia

El 62,2% de casos notificados corresponden a violencia física; seguido de negligencia y abandono con el 2,5%, la violencia psicológica se presenta en un 1,5%. Ver tabla siguiente.

Casos de violencia de género e intrafamiliar según modalidad de violencia, La Guajira Año 2025, Corte S.E 1-42.

Violencia no sexual	No de Casos	%
Fisica	882	62,2
Negligencia y abandono	35	2,5
Psicologica	21	1,5

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Los casos notificados de Actos sexuales, acceso carnal, acoso sexual y otras violaciones sexuales y explotación sexual. Ver tabla siguiente.

Casos de violencia sexual, La Guajira Año 2024, Corte S.E 1-42.

Violencia sexual	No de Casos	%
Acceso carnal	195	13,8
Actos sexuales	174	12,3
Otras violaciones sexuales	56	4,0
Acoso sexual	52	3,7
Explotación sexual	2	0,1

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

INTENTO DE SUICIDIO

La incidencia de intento de suicidio en La Guajira hasta la semana 42 es de 27,3 casos por cada 100.000 habitantes; sin embargo, varios municipios superan la cifra del Departamento, citamos entre ellos a: Barrancas, Distracción, Hatonuevo, Maicao y Riohacha. Ver tabla siguiente.

Tasa de Incidencia de casos de Intento De Suicidio Por Municipio, La Guajira año 2024, Corte S.E 1-42.

Municipio	No de Casos	%	Tasa de Incidencia
ALBANIA	9	3,2	26,5
BARRANCAS	26	9,4	64,5
DIBULLA	6	2,2	13,6
DISTRACCION	7	2,5	46,7
EL MOLINO	1	0,4	12,1
FONSECA	11	4,0	23,5
HATONUEVO	9	3,2	38,8
MAICAO	69	24,9	35,4
MANAURE	6	2,2	6,1
LA JAGUA DEL PILAR	0	0,0	0,0
RIOHACHA	93	33,6	43,8
SAN JUAN DEL CESAR	13	4,7	24,9
URIBIA	18	6,5	9,0
URUMITA	3	1,1	25,3
VILLANUEVA	6	2,2	19,5
Total general	277	100,0	27,3

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Hasta la semana 42 del año 2024 la mayoría de los municipios presentaron un comportamiento estable de casos de intento de suicidio, sin embargo, los municipios de Riohacha, Barrancas, Distracción, Hatonuevo, Maicao y Uribí, se encuentran hacia el incremento.

Comportamiento Inusual del Intento de Suicidio por municipio, La Guajira 2024, Corte S.E 1-42

Municipio	Acumulado	Observado	Esperado	Comportamiento
Guajira. Municipio desconocido	0	0	0	Estable
Riohacha	93	93	77	Incremento
Albania	9	9	8	Estable
Barrancas	26	26	8	Incremento
Dibulla	6	6	7	Estable
Distracción	7	7	3	Incremento
El Molino	1	1	5	Decremento
Fonseca	11	11	10	Estable
Hatonuevo	9	9	2	Incremento
La Jagua del Pilar	0	0	0	Estable
Maicao	69	69	34	Incremento
Manauare	6	6	5	Estable
San Juan del Cesar	13	13	20	Decremento
Uribí	18	18	8	Incremento
Urumita	3	3	3	Estable
Villanueva	6	6	10	Estable

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Otras variables de interés

En el 29,6 % de los casos de intento de suicidio notificados a Sivigila, reportaron conflictos recientes con la pareja o expareja, otros factores comúnmente identificados fueron problemas económicos; el 35,0% presentó idea suicida persistente, siendo la intoxicación el método más usado con 69,0%. Ver tabla siguiente.

Factores desencadenantes del intento de suicidio, La Guajira año 2024, Corte S.E 1-42.

Factores desencadenantes	Casos	Factores de riesgos	Casos	Métodos	Casos
Conflictos con pareja o expareja	29,6% 82	Ideación suicida persistente	35,0% 97	Intoxicación	69,0% 191
Problemas economicos	11,2% 31	Plan organizado de suicidio	11,6% 32	Elemento cortopunzante	17,3% 48
Maltrato físico o psicológico o sexual	7,6% 21	Antecedentes de violencia o abuso	9,0% 25	Ahorcamiento o asfixia	11,9% 33

Fuente: SIVIGILA - Oficina de Vigilancia SDS La Guajira.

CANCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO

Los municipios que presentan mayor casos de cáncer de mama y cuello uterino fueron: Maicao, Riohacha, Fonseca y San Juan del Cesar. Ver tabla siguiente.

Casos de cáncer de mama y cuello uterino por Municipio, Corte S.E 1-42, La Guajira Año 2024.

Municipio	No de personas	%
MAICAO	26	29,2
RIOHACHA	22	24,7
FONSECA	9	10,1
SAN JUAN DEL CESAR	9	10,1
DIBULLA	5	5,6
ALBANIA	3	3,4
BARRANCAS	3	3,4
DISTRACCION	3	3,4
URIBIA	3	3,4
MANAURE	2	2,2
VILLANUEVA	2	2,2
HATONUEVO	1	1,1
URUMITA	1	1,1
Total general	89	100,0

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

El cáncer de mama presentó un 53,9% (48 casos) y el cáncer de cuello uterino presentó un 46,1% que corresponde a (41 casos). Ver tabla siguiente.

Casos de cáncer de mama y cuello uterino, La Guajira Corte S.E. 1-42, Año 2024.

Evento	No de Casos	%
Cáncer de Mama	48	53,9
Cáncer de Cuello Uterino	41	46,1
Total	89	100,0

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Por pertenencia étnica, los otros grupos poblacionales fueron los que presentaron la mayor proporción de casos con un 98,9%; seguido de la población indígena con un 1,1%; el 82,0% de los casos proceden de la cabecera municipal y el 78,7% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. Ver tabla siguiente.

Variables demográficas de cáncer de mama y cuello uterino, La Guajira Corte S.E. 1-42 año 2024.

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia Étnica	Indígena	1	1,1
	ROM (gitano)	0	0,0
	Raizal	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
	Afro colombiano	0	0,0
	Otros	88	98,9
Área	Cabecera municipal	73	82,0
	Centro Poblado	15	16,9
	Rural Disperso	1	1,1
Régimen de Afiliación	Contributivo	13	14,6
	Subsidiado	70	78,7
	Especial	0	0,0
	Excepción	4	4,5
	Indeterminado / Pendiente	0	0,0
	No Afiliado	2	2,2

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

TUBERCULOSIS

Para la semana epidemiológica No. 42 del 2024 se notificaron al SIVIGILA 566 casos de tuberculosis, la incidencia de tuberculosis en el Departamento de La Guajira es de 53.5 casos por 100 000 habitantes, por lugar de residencia, Maicao registra la mayor tasa de incidencia de casos con 100.11 por 100.000 habitantes. Los municipios de Maicao y Riohacha se encuentran por encima de la tasa de incidencia Departamental, por tipo la tuberculosis pulmonar aportó una tasa de 50.3 por 100.000 hab. Ver tabla siguiente.


Notificación de casos Según el tipo de tuberculosis, por municipio de residencia, La Guajira año 2024,

Corte S.E 1-42

Municipio de residencia	No de casos Tb pulmonar	Tasa de incidencia * 100,000 hab	No de casos de TB Extrapulmonar	Tasa de incidencia * 100,000 hab	Total casos TB	Tasa de incidencia * 100,000 hab
Albania	13	36,3	0	0	13	36,33
Barrancas	8	18,3	2	0	10	22,86
Dibulla	19	40,7	1	0	20	42,82
Distraccion	7	44,8	0	0	7	44,77
El molino	4	46,6	0	0	4	46,63
Fonseca	9	17,6	1	0	10	19,54
Hatonuevo	3	12,3	0	0	3	12,31
La jagua del Pilar	1	24,1	0	0	1	24,12
Maicao	192	94,2	12	2,45	204	100,11
Manaure	44	44,6	1	0	45	45,64
Riohacha	132	58,2	7	3,09	139	61,31
San Juan	8	14,3	4	1,79	12	21,46
Uribia	87	44,5	6	1,02	93	47,56
Urumita	1	7,8	0	0	1	7,80
Villanueva	4	11,9	0	0	4	11,85
Total	532	50,3	34	3,22	566	53,5

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Comportamiento epidemiológico de Tuberculosis, SEM 42, 2024, La Guajira



Fuente: SIVIGILA - Oficina de Vigilancia SDS La Guajira.

Se puede observar a corte semana 42, que los municipios de: Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Maicao y Manaure se encuentran en importancia estadística, con tendencia al incremento.

Comportamiento inusual de la tuberculosis por municipio, La Guajira, SEM 1-42 año 2024.

Municipio	Acumulado	Observado	Esperado	Comportamiento
Guajira. Municipio desconocido	0	0	0	Estable
Riohacha	139	41	25	Incremento
Albania	13	6	1	Incremento
Barrancas	10	4	1	Incremento
Dibulla	20	8	4	Incremento
Distracción	7	1	1	Estable
El Molino	4	1	0	Estable
Fonseca	10	1	3	Estable
Hatonuevo	3	1	1	Estable
La Jagua del Pilar	1	0	0	Estable
Maicao	204	70	48	Incremento
Manaure	45	18	7	Incremento
San Juan del Cesar	12	3	3	Estable
Uribia	93	29	25	Estable
Urumita	1	0	1	Estable
Villanueva	4	1	1	Estable

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

El 58.66% (n=332) de los casos se registró en el sexo masculino; con respecto al grupo de edad más afectado se encuentran 25 a 34 años con 22.44 % (n= 127 casos) seguido de los de 15 a 24 con el 19.8 % (n= 108). Ver tabla siguiente.

Proporción según sexo y grupo de edad, casos de tuberculosis, La Guajira año 2024, corte SEM 1-42

Variable	Categoría	No. Casos	Porcentaje
Grupo de edad	0 a 14 años	35	6,18
	15 a 24 años	108	19,08
	25 a 34 años	127	22,44
	35 a 44 años	75	13,25
	45 a 54 años	71	12,54
	55 a 64 años	55	9,72
	65 y mas	95	16,78
Sexo	Femenino	234	41,34
	Masculino	332	58,66

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Durante el año 2024, corte semana No. 42, se han notificado al sistema de información SIVIGILA 566 casos de tuberculosis todas las formas, con respecto al comportamiento del evento de las variables sociales y demográficas tenemos que según pertenencia étnica el mayor porcentaje fue en indígenas con 58.13% (n=329 casos); según área de residencia el 58.83% (n=333 casos) en cabecera municipal, según el régimen de afiliación el 81.60% (n=463 casos) pertenecen al régimen subsidiado. Ver tabla siguiente

Comportamiento demográfico étnico y social de los casos de tuberculosis todas las formas La Guajira corte semana 1-42, año 2024.

Variable	Categoría	No. Casos	Porcentaje
Area de residencia	Cabecera municipal	333	58,83
	Centro poblado	82	14,49
	Rural disperso	576	101,77
Regimen de afiliación	Contributivo	19	3,36
	PNA	49	8,66
	Subsidiado	463	81,80
	Regimen especial	15	2,65
Etnia	Indigena	329	58,13
	Negro/mulato	5	0,88
	Otro	232	40,99

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

En el análisis realizado en la distribución poblacional de los 566 casos notificados al sistema de vigilancia, tenemos que el 13.95% (n=79 casos) de los cuales la mayor incidencia de casos se presenta en el municipio de Maicao, Uribia y Riohacha. Ver siguiente tabla.

Distribución por municipios de residencia de casos de Tuberculosis en población migrante, SEM 42 año 2024

Municipio de residencia	No. Casos	Porcentaje
Albania	2	2,53
Dibulla	1	1,27
Fonseca	3	3,80
Maicao	36	45,57
Manaure	1	1,27
Riohacha	20	25,32
San Juan del Cesar	1	1,27
Uribia	15	18,99
Total	79	100,00

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

De los 566 casos notificados con Tuberculosis en cualquiera de las formas se presentó un 5.52% (n=30 casos) con comorbilidad TB/VIH, presentado el mayor número de casos en el Municipio de Riohacha y Maicao respectivamente.

Distribución por municipios de residencia de casos con TB/VIH, SEM 42 año 2024

Municipio de residencia	No. Casos	Porcentaje
Albania	1	3,33
Distraccion	1	3,33
Dibulla	1	3,33
Maicao	12	40,00
Riohacha	12	40,00
Uribia	1	3,33
Fonseca	2	6,67
Total	30	

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Para el año 2024 con corte semana 42, del total de los casos con TB se ha presentado un 2.65% (n=16 casos) con algún tipo de resistencia de medicamentos de segunda línea como la Isoniazida, Rifampicina. Ver la siguiente tabla.

Distribución de casos de acuerdo al tipo de resistencia, SEM 42 año 2024

MUNICIPIO	TIPO DE RESISTENCIA		
	ISONIAZIDA	RIFAMPICINA-ISONIAZIDA	RIFAMPICINA
Maicao	3	5	1
Riohacha	1	1	1
Uribia	0	1	1
Manaure	0	1	0
Barrancas	0	1	0

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

De los 566 casos notificados en el sistema de información SIVIGILA, con corte a semana 42 se presentó un 6.4 % (n= 36) casos fallecidos.

Mortalidad de casos de Tuberculosis por municipios de residencia, SEM 42 año 2024

Municipio de Residencia	No. Casos	Porcentaje
Barrancas	2	0,35
Dibulla	1	0,18
Maicao	18	3,18
Manaure	2	0,35
Riohacha	8	1,41
San Juan del Cesar	1	0,18
Uribia	4	0,71
Total	36	6,36

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

MALARIA

De acuerdo con la información consolidada en las bases de datos para el evento de malaria Código 465, una vez depurada y analizada se identifica lo siguiente: Al Sistema de Información portal SIVIGILA 4.0 corte a la semana epidemiológica No 42 se han notificado como procedencia La, Guajira un total de 27 casos de malaria, de estos se evidenciaron 4 duplicidades, para un total de 23 casos hasta este periodo analizado, observándose un ligero decremento con relación a los años 2022 y 2023 hasta este mismo corte.

La incidencia acumulada de malaria en el Departamento de La Guajira es de 4.5 casos por 100.000 habitantes, supera la cifra presentada el año anterior (2023) para el mismo periodo analizado. Los municipios con las mayores incidencias acumuladas

son: Riohacha 18,4 (11 casos); Barrancas 9,0 (2 casos); Dibulla 10,1 (4 casos); Maicao 5,6; Manaure 1,2 y Uribia 0,5 (1 caso) respectivamente por cada 100.000 habitantes en riesgo. Solo seis (6) de quince (15) municipios se identificaron caso de malaria es decir un 40%.

Tabla 1. Distribución de casos de Malaria por Municipio de procedencia, semanas epidemiológicas 1- 42, La Guajira 2024

Municipio de procedencia	N° de casos Malaria	Población a riesgo	Incidencia acumulada x 100.000
Riohacha	11	59841	18,4
Maicao	4	71135	5,6
Dibulla	4	39416	10,1
Barrancas	2	22140	9,0
Uribia	1	182463	0,5
Manaure	1	84785	1,2
La Guajira	23	515168	4,5

Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Para malaria, se observan diferencias significativas en su distribución según el sexo. Hasta la semana epidemiológica 42, se ha notificado en personas de sexo masculino un 87% (20 casos) y el 13% en personas de sexo femenino (3 casos).

La mayor proporción de casos de malaria proceden de las cabeceras municipales con un 43% (10 caso), seguidamente, el 39% (9 casos) de malaria confirmados proceden del área rural dispersa, por último, el 17% (4 casos) proceden de centros poblados. Por pertenencia étnica el 21% (5 casos) pertenece a la población indígena y el 73% (17 casos) a otros grupos poblacionales.

Según la afiliación al SGSSS, la mayor proporción de los casos de malaria, notificados están afiliados al régimen subsidiado con un 43% (10 casos), le sigue, el régimen contributivo 17% (4 casos) y los no afiliados con un 17% (4 casos). Por grupo de edad, los menores de 20 a 24 años fueron los más afectados con un 30 (7 casos), seguidamente, los adultos jóvenes de 10 a 14 años con un 21% (5 casos).

Características demográficas y sociales de casos confirmados de Malaria semanas epidemiológicas 1-42, La Guajira año 2024

Variable	Casos	Porcentaje
Sexo	Femenino	3 13,0
	Masculino	20 87,0
Área de Ocurrencia	Cabecera Municipal	10 43,5
	Centro Poblado	4 17,4
	Rural Disperso	9 39,1
Tipo de Régimen en Salud	Contributivo	4 17,4
	Subsidiado	10 43,5
	Excepcion	4 17,4
	ndeterminado/Pendiente	1 4,3
	No Afiliado	4 17,4
Pertenencia Étnica	Indígena	5 21,7
	Rom - Gitano	0 0,0
	Afrodescendiente	1 4,3
	Otro	17 73,9
Grupos de edad	Menor de 1 año	0 0,0
	1 - 4 años	0 0,0
	5 - 9 años	1 4
	10 - 14 años	5 21,7
	15 - 19 años	1 4,3
	20 - 24 años	7 30
	25 - 29 años	4 17
	30 - 34 años	2 8,7
	35 - 39 años	0 0,0
	40 - 44 años	1 4,3
	45 - 49 años	1 4,3
	50 - 54 años	0 0,0
	55 - 59 años	1 4,3
	60 - 64 años	0 0,0
	65 y más	0 0,0
Total Casos	23	100,0


Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

En La Guajira el comportamiento de la Malaria, se observa un aumento en los años 2017 y 2018 con cifras de 29,5 y 18,3 casos por 100.000 habitantes, cifras que continúan con tendencia al decremento en el año 2019 con cifras de 5,4; consecutivamente, para el 2.020 y 2021 con tasas de 4,3 y 2,2 respectivamente. En el año 2022 y 2023 se observa una tendencia al incremento con tasas de 5,6 y 7,1 respectivamente, En el año 2024 hasta la semana epidemiológica 36 se observa una incidencia de 4.5 por 100.000 habitantes en riesgo (515168). Se observa un leve incremento con respecto al año anterior.

De acuerdo al canal endémico de Malaria del Departamento de La Guajira, la situación epidemiológica evidencia que al inicio del año este evento mostro una tendencia al incremento, en el primer periodo se ubica dentro de lo esperado, en zona de seguridad, seguidamente en el segundo en situación de alerta, para el tercer periodo se ubica en situación de brote, luego nuevamente se observa comportamiento al decremento ubicándose finalmente al periodo IX en zona de seguridad.

La metodología utilizada corresponde a las medianas e incluye los casos reportados entre los años 2018 a 2023.

Gráfica 3. Canal endémico de Malaria, La Guajira, S.E No 42



Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Teniendo en cuenta el comportamiento histórico (Datos de años anteriores) podemos observar que los municipios del departamento presentan un comportamiento estable, sin importancia estadísticamente significativa., con tendencia al decremento, para este periodo se esperaban seis (6) en el periodo epidemiológico anterior al análisis y hasta la fecha no se registra casos. Sin embargo, es importante reforzar la vigilancia de este evento.

Tabla 3. Comportamiento inusual en la notificación del dengue, semanas epidemiológicas 1-42, La Guajira año 2024

Municipio	Acumulado	Observado	Esperado	Comportamiento
Riohacha	11	0	2	Estable
Albania	0	0	0	Estable
Barrancas	2	0	0	Estable
Dibulla	4	0	0	Estable
Distracción	0	0	0	Estable
El Molino	0	0	0	Estable
Fonseca	0	0	0	Estable
Hatonuevo	0	0	0	Estable
La Jagua del Pilar	0	0	0	Estable
Maicao	4	0	1	Estable
Manaure	1	0	0	Estable
San Juan del Cesar	0	0	0	Estable
Uribia	1	0	0	Estable
Urumita	0	0	0	Estable
Villanueva	0	0	0	Estable
	23	0	3	

Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

El diagnóstico de malaria se hace en el laboratorio por la identificación de la especie de Plasmodium presente en la sangre, mediante examen microscópico de gota gruesa y extendida de sangre, con recuento parasitario. El Plasmodium puede ser detectado en la gota gruesa con bajas densidades parasitarias, del orden de 5 a 10 parásitos/ul de sangre. El recuento parasitario es necesario para la evaluación clínica del paciente, de acuerdo con la intensidad de la parasitaria.

Hasta la semana epidemiológica No 42 del 2.024 las pruebas de laboratorio más utilizadas para el

diagnóstico de malaria fue la gota gruesa con un 92% (21 casos).

Las características clínicas de la malaria dependen de la especie del parásito, del número de parásitos y del estado inmunitario del huésped. El cuadro clínico clásico consiste en escalofrío, fiebre y sudoración. El ataque agudo se inicia con accesos febriles precedidos por escalofrío, seguidos de intensa sudoración, repetidos cada 48 ó 72 horas, según la especie de Plasmodium. Cuando existen infecciones mixtas se modifica la periodicidad de la fiebre. De acuerdo a lo anterior dieciséis (16) casos es de ir 69% es por la especie infectante vivax y el restante la especie parasitaria falciparum.

Para el año 2.024 hasta la semana epidemiológica 36, el 66% de los casos presentaron sintomatología característica de malaria.

Una vez evaluados los ajustes y realizada la depuración de los casos de acuerdo a los criterios establecidos en el protocolo de malaria a tener en cuenta en la definición de caso, de los casos notificados se reportan (20 casos) de malaria no complicada representado en un 86% y (3 caso) para malaria complicada con un 14%.

Los tres (3) caso de malaria complicada procede del municipio de Maicao de la cabecera municipal y la infección es causada por la especie Plasmodium vivax en 66% de los casos complicados y en 34% Plasmodium Falciparum con él37%, estos casos presentaron complicaciones hematológicas y pulmonar.

Proporción de casos de malaria, S.E 42, La Guajira año 2024

Complicaciones	N° Casos Notificados	%
Malaria no complicada	20	90,9
Malaria complicada	3	13,6
Total casos de Malaria	23	100

Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

El total de casos notificados al portal SIVIGILA 4.0 en código o ficha No 465 como Departamento de notificación tenemos que la red prestadora del Departamento de La, Guajira notificaron un total de 27 casos de estos, de estos el 82% son de procedencia La Guajira.

Los casos fueron notificados por las entidades territoriales de: Riohacha (12) casos, Dibulla (1), Maicao (2), San Juan del Cesar (4).

El departamento de La, Guajira registra un 8% en la oportunidad en el diagnóstico.

Oportunidad en el tratamiento de los casos de malaria, departamento de La Guajira, S.E 1 – 42 de 2.024

Municipio de procedencia	N° de casos con tratamiento oportuno	N° de casos Malaria	%
Dibulla	1	3	33
Distracción	0	1	0
Maicao	4	4	100
Riohacha	11	13	85
San Juan del Cesar	5	5	100
Uribia	1	1	100
La Guajira	22	27	81

Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Con relación a la oportunidad del tratamiento se analizaron todos los casos notificado como Departamento de notificación La Guajira, en esta oportunidad se evidenciaron veinte y siete (27) casos de los cuales solo veinte y dos (22) recibieron oportunamente su tratamiento para un 85% en el indicador.

MORBILIDAD DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA IRA

En el departamento de la guajira para el corte analizado se puede evidenciar que las infecciones respiratorias agudas están en un comportamiento inusual al incremento igual que 9 de sus 15 municipios. Ver tabla siguiente

Comportamiento inusual de la infección respiratoria aguda en población general año 2024 S. E 42


Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamiento
La Guajira	200,074	13,043	20,267	Aumento

Municipio	Esperado	Obsvado	Comportamiento
Albania	74	30	Disminución
Barrancas	300	698	Aumento
Dibulla	149	102	Disminución
Distraccion	50	90	Aumento
El Molino	156	103	Disminución
Fonseca	485	561	Ninguno
Hatonuevo	137	198	Aumento
La Jagua del Pilar	22	39	Aumento
Maicao	2547	4524	Aumento
Manaure	1026	2065	Aumento
Riohacha	3724	6004	Aumento
San Juan del Cesar	515	528	Ninguno
Uribia	2748	4410	Aumento
Urumita	57	61	Ninguno
Villanueva	40	124	Aumento

Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

Comportamiento semanal de la IRA según notificación semanal, evidencia un incremento significativo superando la media esperada para el corte analizado con tendencia al aumento teniendo en cuenta el inicio del segundo pico respiratorio del año.

Canal endémico de la infección respiratoria aguda en población general año 2024 S.E 42



Fuente: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SDS La Guajira

MORBILIDAD DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EDA

En el departamento de La Guajira a semana epidemiológica No 42 año 2024 registra un total de 60.815 casos de morbilidad por EDA en población total, con un promedio de 1.447 casos por semana y un equivalente de 57,5 casos por cada 1.000 habitantes.

Los municipios con mayor prevalencia de enfermedad diarreica aguda EDA son: Riohacha con 119; Uribia con un 104, Albania con el 34 y El Molino 33; Maicao 29; Hatonuevo 26; Distracción 24,2 por cada 1000 habitantes.

Los municipios del norte; Riohacha y Uribia alcanzan a obtener más del 75% de los casos notificados de EDA para el departamento de La Guajira.

Distribución de casos de EDA y proporción de incidencia de EDA por cada 100.000 habitantes por municipio de procedencia, S.E No 42 La Guajira año 2024.

Municipio por procedencia	Total de casos de EDA	% de casos	Población TOTAL	Porporción de Incidencia de la EDA *1000 hb
ALBANIA	1238	2,0	35785	34,6
BARRANCAS	527	0,9	43744	12,0
DIBULLA	568	0,9	46710	12,2
DISTRACCION	379	0,6	15636	24,2
EL MOLINO	287	0,5	8579	33,5
FONSECA	814	1,3	51188	15,9
HATONUEVO	656	1,1	24362	26,9
LA JAGUA DEL PILAR	35	0,1	4143	8,4
MAICAO	5937	9,8	203769	29,1
MANAURE	1222	2,0	98601	12,4
RIOHACHA	27164	44,7	226715	119,8
SAN JUAN DEL CESAR	1031	1,7	55912	18,4
URIBIA	20408	33,6	195532	104,4
URUMITA	92	0,2	12822	7,2
VILLANUEVA	457	0,8	33751	13,5
Total	60815	100,0	1057249	57,5

Fuente: oficina de vigilancia en salud pública, SIVIGILA 4,0

Según el sexo las mujeres ocupan el 55% de los casos y los hombres el 45%. Los municipios que representan porcentaje de casos de EDA atendidos y que se hospitalizaron son: San Juan del Cesar, Uribia, Maicao, Riohacha, La Jagua del Pilar, Barrancas y Dibulla entre otros.

Distribución porcentual de los casos de EDA hospitalizados del total de las consultas por municipios, S.E: No 42 La Guajira año 2024.

municipio de procedencia	Pacientes Hospitalizados	Total de casos de EDA	%
ALBANIA	4	1238	0,3
BARRANCAS	22	527	4,2
DIBULLA	14	568	2,5
DISTRACCION	0	379	0,0
EL MOLINO	0	287	0,0
FONSECA	0	814	0,0
HATONUEVO	0	656	0,0
LA JAGUA DEL PILAR	4	35	11,4
MAICAO	982	5937	16,5
MANAURE	2	1222	0,2
RIOHACHA	3969	27164	14,6
SAN JUAN DEL CESAR	253	1031	24,5
URIBIA	4720	20408	23,1
URUMITA	0	92	0,0
VILLANUEVA	0	457	0,0
TOTAL	9970	60815	16,4

Fuente: oficina de vigilancia en salud pública, SIVIGILA 4,0

Según el grupo de edad, las incidencias más altas para el departamento se concentra en los niños menores de un año y el municipio de Uribia municipios, evidenciando que Uribia, Riohacha, Hatonuevo y san juan del Cesar se afectan en gran medida los menores de un año.

Las consultas por niños de 1 a 4 años los municipios de Uribia, Riohacha, El Molino y Maicao.


Incidencia de casos de EDA menores de 1 año y de 1 a 4 años, por municipios La Guajira S.E: No 42 año 2024

Municipio por procedencia	menores 1 año	Incidencia de casos	1 a 4 años	Incidencia de casos
ALBANIA	60	80,9	234	78,2
BARRANCAS	37	44,8	153	45,8
DIBULLA	5	5,2	63	16,1
DISTRACCION	18	63,8	56	49,6
EL MOLINO	12	95,2	83	161,2
FONSECA	71	67,9	237	56,4
HATONUEVO	72	149,4	104	53,3
LA JAGUA DEL PILAR	1	14,5	8	28,3
MAICAO	456	104,8	2494	142,2
MANAURE	158	62,6	723	70,9
RIOHACHA	1995	421,5	5403	283,3
SAN JUAN DEL CESAR	122	135,7	320	88,1
URIBIA	2639	676,3	3547	224,2
URUMITA	0	0,0	4	0,1
VILLANUEVA	23	38,7	63	26,2

Fuente: oficina de vigilancia en salud pública, SIVIGILA 4,0

El canal endémico del departamento de La Guajira, nos indica que desde la semana 31 se evidencia un aumento sostenido de casos ubicándolo dos y tres veces por encima de lo esperado, con un comportamiento de brote en las últimas semanas

Canal endémico de la EDA, departamento de La Guajira S.E: No 42 año 2024



Fuente: oficina de vigilancia en salud pública, SIVIGILA 4,0

Barrancas, La Jagua del Pilar, Maicao, El Molino; Uribia, Distracción y Dibulla se encuentran en aumento, a diferencia de Hatonuevo, Fonseca, San Juan del Cesar, Albania, Manaure y Urumita en disminución

Variación en el comportamiento de la notificación de la EDA, año 2023-2024

Entidad territorial	Casos año anterior	Casos último año	Variación %
La Guajira	42.191	59.186	40 %
Riohacha	12.282	26.772	118 %
Villanueva	210	453	116 %
Barrancas	229	491	114 %
La Jagua Del Pilar	19	35	84 %
Maicao	4.120	5.737	39 %
El Molino	237	277	17 %
Uribia	17.247	19.848	15 %
Dibulla	453	496	9 %
Distracción	336	360	7 %
Hatonuevo	636	577	-9 %
Fonseca	962	786	-18 %
San Juan Del Cesar	1.294	987	-24 %
Albania	1.592	1.156	-27 %
Manaure	2.365	1.131	-52 %
Urumita	209	80	-62 %

Fuente: oficina de vigilancia en salud pública, SIVIGILA 4,0

INTOXICACIONES QUÍMICAS

La incidencia de las Intoxicaciones Agudas por Sustancias Químicas en La Guajira, para las semanas SE.1-42 del año 2024 es del 18,8% por cada 100.000 habitantes, no obstante municipios como **el Molino, la Jagua del Pilar, Villanueva, Riohacha y Dibulla** continúan por encima de la cifra del Departamento. Ver tabla siguiente.

Tasa de incidencia de las Intoxicaciones Agudas por Sustancias Químicas por municipio de procedencia La Guajira, Corte S.E 1-42 de 2024

Municipios	No de	%	Tasa de ir	Poblacion a Riesgo
ALBANIA	4	2,1	11,8	33946
DIBULLA	12	6,3	27,1	44251
DISTRACCION	1	1,0	6,7	14987
EL MOLINO	19	19,6	229,2	8288
FONSECA	4	4,1	8,5	46855
MAICAO	34	35,1	17,5	194675
MANAURE	1	1,0	1,0	98299
RIOHACHA	61	62,9	28,7	212314
SAN JUAN DEL CE	4	4,1	7,7	52157
URIBIA	24	24,7	12,0	199987
VILLANUEVA	18	18,6	58,5	30753
BARRANCAS	5	5,2	12,4	40338
HATONUEVO	0	0,0	0,0	23181
URUMITA	1	1,0	8,4	11845
LA JAGUA DEL PIL	3	3,1	74	4033
Total general	191	196,9	18,8	1015909

FUENTE: SIVIGILA-Oficina de vigilancia SSDG La Guajira

Según la variación del año 2023 y 2024 nos indica que los municipios de Riohacha, Villanueva,

La mayoría de los municipios continúan presentando un comportamiento estable a las Intoxicaciones Agudas por Sustancias Químicas hasta las S.E 1-42 del año 2024, mientras que los municipios **el Molino, Riohacha, Uribí y Dibulla** presentan un **incremento**. El municipio de **Fonseca y Villanueva** continúan presentando un **decremento**. Ver tabla siguiente.

Comportamiento inusual de las Intoxicaciones Agudas por Sustancias Químicas por municipio La Guajira, Corte, S.E 1-42 de 2024.

Municipio	Observado	Esperado	Comportamiento
ALBANIA	4	4	Estable
DIBULLA	12	5	Incremento
DISTRACCION	1	3	Estable
EL MOLINO	19	3	Incremento
FONSECA	4	9	Decremento
MAICAO	34	31	Estable
MANAURE	1	2	Estable
RIOHACHA	61	33	Incremento
SAN JUAN DEL CESAR	4	6	Estable
URIBIA	24	7	Incremento
VILLANUEVA	18	22	Decremento
BARRANCAS	5	5	Estable
HATONUEVO	0	1	Estable
URUMITA	1	2	Estable
LA JAGUA DEL PILAR	3	1	Estable

Fuente: oficina de vigilancia en salud pública, SIVIGILA 4,0

ENFERMEDADES HUERFANAS

Con el fin de analizar y determinar que entidades territoriales se encuentran con comportamiento inusual para el evento enfermedades huérfanas y realizar seguimiento al aumento o disminución de casos, con significado estadístico, se utilizó la Distribución de Poisson; se incluyó el número de casos de cada municipio por periodo epidemiológico desde el año 2019 al 2023 y lo observado en 2024, se evidencio que los municipios de **Maicao, Albania, Fonseca, Hatonuevo y San Juan del Cesar** se encuentran en **Incremento** y en los municipios de **Uribí, Manaure, Dibulla, Barrancas y Villanueva** están en **Decremento**. Los municipios de **Riohacha, Albania, Distracción, El Molino, Urumita, y las Jagua del pilar** su comportamiento es **estable**. Ver Tabla Siguiente

Comportamiento inusual de Enfermedades Huérfanas - raras según municipio de residencia años 2019 - 2023 La Guajira, S.E. 1 – 42 de 2024

MUNICIPIOS	Corte SE 42 de 2019	Corte SE 42 de 2020	Corte SE 42 de 2021	Corte SE 42 de 2022	Corte SE 42 de 2023	Corte SE 42 de 2024	Valor Esperado	Poisson
RIOHACHA	11	7	11	15	19	13	13	0,023
MAICAO	3	10	1	7	6	6	5	0,156
URIBIA	1	3	4	7	0	2	3	0,050
MANAURE	3	0	2	4	0	1	2	0,165
DIBULLA	0	0	0	4	1	0	1	0,368
ALBANIA	4	2	0	1	0	2	1	0,247
HATONUEVO	1	0	0	0	1	5	0	0,268
BARRANCAS	4	1	3	0	2	1	2	0,271
FONSECA	4	2	3	6	3	12	4	0,212
DISTRACCION	0	1	0	1	0	0	0	0,670
SAN JUAN DEL CESAR	8	3	3	3	7	6	5	0,096
EL MOLINO	0	0	0	0	0	0	0	1,000
VILLANUEVA	2	1	1	2	3	1	2	0,161
URUMITA	0	0	0	0	0	0	0	1,000
LA JAGUA DEL PILAR	1	0	0	0	0	0	0	1,000
TOTAL	42	30	28	50	42	49	38	0,051

Fuente SIVIGILA – Oficina de Vigilancia SDS, La Guajira

En el departamento de La Guajira a Semana Epidemiológica N° 1 - 42 se han presentado **49 casos** de Enfermedades Huérfanas o Raras, según municipio de residencia que presenta mayor número de casos es el municipio de Riohacha con un porcentaje de 26,5% (13 casos), seguido de Fonseca con un 24.4% con (12 casos) los municipios de Maicao y San Juan del Cesar con un porcentaje de 12.2% (6 casos cada uno), Hatonuevo con un porcentaje de 10,2% (5 casos), los municipios de Uribí y Albania con un 4.1% (2 casos cada uno), el municipio de Manaure, Barrancas y Villanueva con un 2.1% (1 caso cada uno); respectivamente Ver Tabla Siguiente.

Distribución de casos de La Enfermedades Huérfanas – Raras por Municipios de Residencia, La Guajira S.E N° 1 – 42 del 2024

Municipios	N° de Casos	Porcentaje
RIOHACHA	13	26,53
FONSECA	12	24,49
MAICAO	6	12,24
SAN JUAN DEL CESAR	6	12,24
HATONUEVO	5	10,20
URIBIA	2	4,08
ALBANIA	2	4,08
MANAURE	1	2,04
BARRANCAS	1	2,04
VILLANUEVA	1	2,04
DIBULLA	0	0,00
DISTRACCION	0	0,00
EL MOLINO	0	0,00
URUMITA	0	0,00
LA JAGUA DEL PILAR	0	0,00
Total	49	100,00

Fuente SIVIGILA – Oficina de Vigilancia SDS, La Guajira

CONCLUSIONES EFERMEDADES HUERFANAS
SEMANA EPIDEMIOLOGICA 1- 42 AÑO 2024.

Se puede concluir que la población más afectada en el Departamento de la Guajira es el sexo femenino con (28) casos con un porcentaje de 57% y el sexo masculino con (21) casos con 43%, se presentó mayor incidencia en el régimen subsidiado, entre 0-11 años y 11 a 17 años son el rango de edad que presentaron más casos de E.F. con 33 (casos).

Las EAPB con más casos fue Sanitas con 26 casos, Caja Copi con 6 casos, Dusakawi con 5 casos, Nueva EPS con 5 casos y que la Drepanocitosis es la enfermedad huérfana con mayor prevalencia en el Departamento de la Guajira en la S.E 1- 42 año 2024 con 20 casos, seguido de la Beta-talasemia y Amiloidosis con 3 casos.




Gobernación
de La Guajira

Boletín epidemiológico semanal

BES No. 42. año 2024

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
TABLERO DE CONTROL No 42 AÑO 2024
NOTIFICACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA DISTRIBUIDOS POR MUNICIPIOS

 Eventos de interes en salud pública Semana No 42 año 2024	Total departamento			Riohacha			Maicao			Manaure			Uribia			Dibulla			Albania			Hatonuevo			Barrancas			Fonseca			Distracción			San Juan del Cesar			El Molino			Villanueva			Urumita			La Jagua del Pilar		
	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado	Esperado	Observado	Total acumulado						
Dengue	42	52	1217	5	14	597	1	2	85	1	1	35	1	3	50	4	5	62	0	2	17	2	0	87	2	1	48	6	2	26	0	1	15	5	1	33	0	3	6	8	20	153	3	0	0			
Malaria	6	0	23	2	0	11	1	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mortalidad materna	13	17	17	4	4	4	3	6	6	1	2	2	2	4	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	320	235	235	69	63	63	94	66	66	21	24	24	72	49	49	6	3	3	8	2	2	6	6	6	13	3	3	10	2	2	3	1	1	14	6	6	1	3	3	3	4	4	2	2	2	1	1	1
morbilidad materna extrema	1033	1188	1188	330	296	296	293	444	444	64	84	84	197	160	160	11	29	29	21	19	19	13	13	13	15	26	26	28	35	35	7	9	9	29	40	40	2	4	4	21	20	3	8	8	1	1	1	
Intento de suicidio	198	277	277	77	93	93	34	69	69	5	6	6	8	18	18	7	6	6	8	9	9	2	9	9	8	26	26	10	11	11	3	7	7	20	13	13	5	1	1	10	6	6	3	3	3	0	0	0
Violencia de género e intrafamiliar	1059	1419	1419	404	466	466	189	381	381	14	36	36	56	116	116	50	55	55	31	23	23	20	32	32	34	56	56	62	63	63	16	45	45	67	54	54	14	12	12	89	54	54	12	17	17	2,3	9	9
Hepatitis A	120	183	566	25	41	139	48	70	204	7	18	45	25	29	93	4	8	20	1	6	13	1	1	3	1	4	10	3	1	10	1	1	7	3	3	12	0	1	4	1	1	4	1	0	1	0	0	
Enfermedades Huerfanos o Raras	38	49	49	12	13	13	5	6	6	2	1	1	3	2	2	1	0	0	1	2	2	0	5	5	2	1	1	4	12	12	0	0	0	5	6	6	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Intoxicaciones ASQ	155	191	191	36	61	61	35	34	34	2	1	1	7	24	24	6	12	12	4	4	4	1	0	0	5	5	5	10	4	4	3	1	1	6	4	4	3	19	19	26	18	18	2	1	1	1	3	3

Fuente SIVIGILA – Oficina de Vigilancia SDS, La Guajira

INCREMENTO



DECREMENTO

NOTIFICACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA EN POBLACIÓN CON NACIONALIDAD VENEZOLANA DISTRIBUIDOS POR MUNICIPIOS SEMANA No 42 AÑO 2024

MORBILIDAD POR EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	Municipio que notifica															Total	%
	Riohacha	Maicao	Uribia	Manaure	Dibulla	Albania	Hatonuevo	Barrancas	Fonseca	Distracción	San Juan del Cesar	El Molino	Villanueva	Urumita	La Jagua del Pilar		
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	100	117	23	3	5	3	5	15	6	5	9	5	10	2	0	308	24,2
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	32	93	15	2	6	3	1	7	7	1	4	0	1	0	0	172	13,5
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	68	60	2	3	3	7	5	6	12	2	12	2	10	1	1	194	15,2
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	20	20	31	2	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	80	6,3
CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
DENGUE	45	5	1	1	7	2	5	5	1	0	3	1	15	0	0	91	7,1
TUBERCULOSIS	30	44	25	1	3	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	109	8,6
SIFILIS GESTACIONAL	18	26	13	1	0	1	1	2	5	3	1	0	1	0	0	72	5,7
VARICELA INDIVIDUAL	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0,6
INTENTO DE SUICIDIO	12	10	2	0	0	2	3	3	0	1	1	0	0	0	0	34	2,7
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	3	2	11	0	0	1	3	4	0	0	0	2	0	0	0	26	2,0
ACCIDENTE OFIDICO	1	1	1	0	4	3	2	2	1	0	1	0	1	0	0	17	1,3
BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
INTOXICACIONES	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	9	0,7
MALARIA	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0,3
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS ANTIPERSONAL)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4
PAROTIDITIS	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	0,5
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2
SIFILIS CONGENITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
LEISHMANIASIS CUTANEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1
LEPTOSPIROSIS	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
DEFECTOS CONGENITOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
DENGUE GRAVE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1
TETANOS ACCIDENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	6	6	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	16	1,3
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,8
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y/O DESNUTRICIÓN	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4
VIH/SIDA/MORBILIDAD POR SIDA	15	22	3	0	0	3	1	0	4	0	2	0	0	0	0	50	3,9
CANCER EN MENORES DE 18 AÑOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0,2
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	0	37	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	43	3,4
TOTAL	362	466	139	13	37	29	27	50	41	14	41	10	38	4	2	1273	100,0

Fuente SIVIGILA – Oficina de Vigilancia SDS, La Guajira

MORTALIDAD POR EVENTO DE INTERES EN SALUD PUBLICA	Municipio que notifica															Total	%
	Riohacha	Maicao	Uribia	Manaure	Dibulla	Albania	Hatonuevo	Barrancas	Fonseca	Distracción	San Juan del Cesar	El Molino	Villanueva	Urumita	La Jagua del Pilar		
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	6	21	3	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0	37	84,1
MORTALIDAD POR DESNUTRICION < DE 5 AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
MORTALIDAD MATERNA	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11,4
MORTALIDAD POR IRA < DE 5 AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
MORTALIDAD POR EDA < DE 5 AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4,5
TOTAL	7	27	3	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0	44	100,0

Fuente SIVIGILA – Oficina de Vigilancia SDS, La Guajira